



**Planche 10.** *Ophrys philippeii* et *O. santonica*.

En haut à gauche: *Ophrys santonica*. Les Bouchauds (loc. typ.), Charente, 22.VI.1996.  
 En haut à droite et en bas: *Ophrys philippeii*. En haut: Belgentier, Var, 14.V.2001, en bas:  
 Montrieux, Var, 9.V.2001.

(dias P. DELFORGE)

## Note rectificative sur l'identité d'*Ophrys philippeï* GRENIER 1859

par Pierre DELFORGE (\*)

**Abstract.** P. DELFORGE.- Correction about the identity of *Ophrys philippeï* GRENIER 1859. In a previous paper (DELFORGE 2000A), I have attributed the name *Ophrys philippeï*, taxon from Montrieux (Var, France) described by GRENIER (1859), to a late flowering *Ophrys scolopax* s.l. with small flowers, membre of the *O. tetraloniae* species group, and known as *O. santonica* MATHÉ & MELKI 1994. The recent rediscovery of *O. philippeï* in its *locus typicus* has shown that it is an original taxon, not identifiable with *O. santonica* nor with *O. scolopax*. Therefore, *Ophrys santonica* MATHÉ & MELKI 1994 is the name having priority for the scolopaxoide species of the *O. tetraloniae* group present in Alpes-Maritimes (06) and Var (83), Aveyron (12, Southern Massif Central) and Poitou-Charentes (Charente, 16; Charentes-Maritimes, 17; Deux-Sèvres, 79).

**Key-Words:** *Orchidaceae*, genus *Ophrys*, *Ophrys tetraloniae* species group, *Ophrys philippeï*, *Ophrys santonica*. Flora of France.

Dans une série d'études destinées à délimiter le groupe d'*Ophrys tetraloniae* et à établir sa composition (notamment DELFORGE 1994: 332-333, 1996, 2000A, B, C, D, 2001; DELFORGE et al. 2000), j'ai été amené à identifier à *Ophrys philippeï* GRENIER 1859 l'*O. «scolopax»* tardif à petites fleurs parfois fucifloroïdes décrit par MATHÉ et MELKI (1994A), d'abord sous le nom illégitime d'*Ophrys aestivalis* (non POIRET 1798), puis sous celui d'*Ophrys santonica* (MATHÉ & MELKI 1994B). Depuis sa description, *O. santonica* était considéré comme un endémique du Poitou-Charentes (BOURNÉRIAS 1998), mais j'avais trouvé des populations devant lui être rapportées en Aveyron dès 1980 (DELFORGE 2000A), ainsi que dans le Var et les Alpes-Maritimes (DELFORGE & TYTECA 1982). La présence de cette espèce dans le sud-est de la France posait la question d'une description antérieure à celle de MATHÉ et MELKI (1994B). Je me suis donc penché sur l'identité d'*O. philippeï* GRENIER 1859, taxon énigmatique récolté à Montrieux près de Toulon le 21 mai 1859, figuré par MOGGRIDGE (1869) d'après un exemplaire cultivé, et qui semblait avoir disparu depuis 1912. Après avoir démontré qu'*O. philippeï* n'était certainement pas un hybride occasionnel entre *O. sphogodes* s.l. et *O. scolopax* s.l., comme on le pense très généralement depuis CAMUS (1893), j'ai examiné la description et des copies des exsiccata de GRENIER et j'ai identifié *O. santonica* à *O. philippeï* (DELFORGE 2000A, 2001).

Très récemment, un taxon tout à fait identique aux figures de MOGGRIDGE (1869) a été trouvé fortuitement par P.-M. BLAIS dans la région de Montrieux, d'où provient le type de GRENIER. Cette redécouverte a fait l'objet d'un dossier

(\*) avenue du Pic Vert 3, B-1640 Rhode-Saint-Genèse  
E-mail: p.delforge@belgacom.net

Manuscrit déposé le 4.XI.2001, accepté le 7.XI.2001

Les Naturalistes belges, 2001, 82, hors-série - spécial Orchidées n°14: 137-139

particulier sur le site internet «Orchidées de Provence» dès mai 2001 (<http://perso.wanadoo.fr/pm.blais/doss.opphil>). P.-M. BLAIS y note qu'il a pu mettre le nom d'*O. philippe* sur ce taxon grâce à ma mise au point et donne une importante et excellente iconographie, y compris de parts d'herbier, qui démontre qu'*O. philippe*, tel que je l'ai lectotypifié (DELFORGE 2000A: 133), est un taxon différent *O. santonica*, ce que j'ai pu vérifier sur le terrain en 2001 (Pl. 10 p. 137). J'ai été induit en erreur par la description confuse de GRENIER, le fait que la plante représentée par MOGGRIDGE semblait un individu aberrant d'*O. scolopax* probablement disparu, ainsi que par l'hétérogénéité des parts d'herbier de GRENIER, dont une fleur pressée de face n'appartient certainement pas à *O. philippe* (DELFORGE 2000A: fig. 7). En conséquence, *Ophrys santonica* est le nom valable pour l'espèce délimitée et figurée dans le "Guide des Orchidées d'Europe" (DELFORGE 2001: 446). Je laisse bien entendu à P.-M. BLAIS le soin de préciser la description, le statut et les affinités du taxon qu'il a retrouvé.

### Remerciements

Je voudrais remercier P.-M. BLAIS (Entrecasteaux, Var), pour les nombreux échanges que nous avons eus à propos d'*Ophrys philippe* et qui ont entraîné la présente rectification, ainsi que Julien VIGLIONE (Aix-en-Provence) et Errol VÉLA (Marseille), qui m'ont permis d'observer ce curieux taxon sur le terrain.

### Bibliographie

- BOURNÉRIAS, M. [éd.] 1998.- Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg: 416p. Biotope, coll. Parthénope, Paris.
- CAMUS, E.G. 1893.- Monographie des Orchidées de France. *Journ. de Bot.* **7**: 111-116; 131-140; 155-160.
- DELFORGE, P. 1994.- Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 480p. Delachaux et Niestlé, Lausanne - Paris.
- DELFORGE, P. 1996.- L'Ophrys du Gers, *Ophrys aegirtica*, une espèce méconnue de la flore française. *Natural. belges* **77** (Orchid. 9): 191-217.
- DELFORGE, P. 2000A.- L'Ophrys de Monsieur Philippe. *Natural. belges* **81** (Orchid. 13): 111-144 + 8 figs.
- DELFORGE, P. 2000B.- *Ophrys aramaeorum* sp. nova, une espèce orientale du groupe d'*Ophrys tetraloniae*. *Natural. belges* **81** (Orchid. 13): 225-231 + 2 figs.
- DELFORGE, P. 2000C.- Remarques sur les *Ophrys fuciflora* tardifs d'Italie péninsulaire méridionale et description d'*Ophrys posidonia* sp. nova. *Natural. belges* **81** (Orchid. 13): 157-175 + 8 figs.
- DELFORGE, P. 2000D.- Nouvelle contribution taxonomique et nomenclaturale aux Orchidées d'Europe. *Natural. belges* **81**: 396-398.
- DELFORGE, P. 2001.- Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 2<sup>e</sup> éd., 592p. Delachaux et Niestlé, Lausanne - Paris.
- DELFORGE, P. & TYTECA, D. 1982.- Observations sur les orchidées des Préalpes de Grasse, de l'Esterel et des Maures. *Natural. belges* **63**: 53-90.
- DELFORGE, P., DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J. 2000.- *Ophrys linearis*, le nom correct au rang spécifique de l'*Ophrys "fuciflora* à longs pétales" du sud-est de la France. *Natural. belges* **81** (Orchid. 13): 145-156 + 4 figs.
- GRENIER, C. 1859.- Recherches sur quelques Orchidées des environs de Toulon ou notes rédigées d'après les plantes vivantes communiquées par M. Philippe. *Mém. Soc. Émul. Doubs Sér. 3*, 4: 395-404.
- MATHÉ, J.-M. & MELKI, F. 1994A.- *Ophrys aestivalis*, une nouvelle espèce à floraison tardive dans le centre-ouest de la France. *L'Orchidophile* **25** (112): 120-126.
- MATHÉ, J.-M. & MELKI, F. 1994B.- *Ophrys santonica*: un nouveau nom valide pour *Ophrys aestivalis* MATHÉ & MELKI. *L'Orchidophile* **25** (113): 158-159.
- MOGGRIDGE, J.T. 1869.- Über *Ophrys insectifera* L. (part.). *Nova Acta Leop.-Carol. Dtsch. Akad. d. Naturf. Dresden* **35** (3): 1-16.