



HERBARIUM Pierre DELFORGE
O r c h i d a c e a e

Anacamptis pyramidalis

(L.) L.C.M. RICHARD

var. *cerigensis*

P. DELFORGE 2010

Date: 19.IV.2010

N° 11010

Pays: Grèce

Région: Attique

Province: Cythère

Localité: Cythère, Babakou

Altitude: 140 m

UTM_{WGS84}: 34SFF8513

Habitat: sur affleurements calcaires, broussailles pâturées à *Calicotome villosa*, *Genista sphacelata*, *Olea europaea* var. *oleaster*, *Pistacia lentiscus*, *Sarcopoterium spinosum*, *Thymus capitatus* ainsi qu'*Anacamptis pyramidalis* var. *brachystachys*, *Anteriorchis fragrans*, *Neotinea tridentata*, *Ophrys calypsus* var. *pseudoapulica*, *O. ceto*, *O. phryganae*, *O. sicala*, *Orchis italica*, *Serapias orientalis* var. *orientalis*, *Vermeuleniana papilionacea* var. *aegaea*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Cythère (Attique, Grèce). *Natural. belges* **91** (Orchid. 23) [2010]: 164.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2010

H O L O T Y P E

Anacamptis pyramidalis

(L.) L.C.M. RICHARD

var. *cerigensis* P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, ad 21 cm alta. Inflorescentia elongata, 65 mm alta et 17 mm lata. Flores 98, alabastra 18, candidi, pro specie *Anacamptidis pyramidalis* parvii. Labellum 3 × 3 mm, profunde trilobatum, cum basilaribus callis attenuatis calcarique solum 9 mm longo et clavato. *Anacamptis pyramidalis* var. *brachystachys* et var. *nivea* affinis a quibus inflorescentia elongatiore angustioreque, floribus parvioribus, labelli basilaribus callis attenuatis et calcari minus longo clavatoque differt. Floret satis sero, paulum post *Anacamptidem pyramidalem* var. *brachystachyn* *Cytherorum*.

Holotypus: Graecia, insula Cythera, Babakou (UTM: 34SFF8513), alt. s.m. 140 m, 19.IV.2010. Leg. P. DELFORGE. In herb. P. Delforge sub n° 11010.

Étymologie: *cerigensis*, *is*, *e*: de Cerigo. Cerigo: nom italien de l'île de Cythère.

Référence: DELFORGE, P. 2010.- Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Cythère (Attique, Grèce). *Natural. belges* **91** (Orchid. 23): 164.

Description: comme *Anacamptis pyramidalis* var. *pyramidalis* mais inflorescence allongée; jusqu'à 115 très petites fleurs blanchâtres; labelle 3 × 3 mm; crêtes basales réduites; éperon claviforme, long de 8-10 mm.

Floraison: IV, un peu après la var. *brachystachys*.

Répartition: probablement endémique de l'île de Cythère; cependant signalé aussi de l'île de Vis (Croatie).

Référence: p. 266 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.

11010
CYT