



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys aramaeorum
P. DELFORGE 2000

Date: 27.V.1990 N° 09049
Pays: Turquie Région: Anatolie
Province: Diyarbakir Localité: Kulp
Altitude: 870 m UTM_{WGS84}: 37SFC6260

Habitat: talweg limoneux humide avec *Anacamptis pyramidalis*, *Anteriorchis coriophora*, *Ophrys cilicica*, *O. phrygia*, *O. aramaeorum* × *O. phrygia*, *Orchis punctulata*, *O. simia*, *Paludorchis pseudo-laxiflora*.

Publication: DELFORGE, P. - *Ophrys aramaeorum* sp. nova, une espèce orientale du groupe d'*Ophrys tetraloniae*. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 228 [2000].

leg. & dét. Pierre DELFORGE 1990 & 2000

H O L O T Y P E



Ophrys aramaeorum

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque, 55 cm alta. Bractae elongatae. Inflorescentia laxiflora. Flores satis parvi, 7. Sepala lilacina, patula, lateralia 12 mm longa. Petala concoloria, parva, triangulata, subauriculata, villosa, 2,5 mm longa, 2 mm lata. Labellum 9 mm longum et 11,5 mm latum, integrum, subquadrangulatum, convexum, molle in centro, marginibus angustis glabrisque, leviter gibbosum ad basin, pilis bubalinis, longis sed attenuatis in apicale parte omnino cinctum; area basalis labelli ferruginea; macula evoluta, basalis centralisque, ocellata in centro, caerulea-brunnea, flavo-virente marginata; appendix satis evoluta, chlorina, tridentata, erecta. Cavitas stigmatica ferruginea, cum projectura; pseudo-oculi rotundati, viridi-nigri; puncti staminodiales praesentes. Floret satis sero, a medio Maji usque ad finem Junii.

Holotypus: Anatolia, provincia Diyarbakir, apud Kulp (UTM: 37SFC6260), alt. s.m. 870 m, 27.V.1990. Leg. P. DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub n° 09049.

Étymologie: *Aramaeorum*: des Araméens, peuple sémite qui domina le Proche-Orient et le sud-est Anatolien dans la haute Antiquité.

Référence: DELFORGE, P. 2000.- *Ophrys aramaeorum* sp. nova, une espèce orientale du groupe d'*Ophrys tetraloniae*. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 228.

Description: plante élancée, haute de 25-65 (-80) cm; 3-12 fleurs assez petites; sépales blanchâtres à pourpre foncé, 9,5-15 × 5-8,5 mm; pétales concolores, courts, triangulaires-arrondis, 1,5-4 × 1,5-3 mm; labelle subhorizontal; entier à parfois trilobé, subglobuleux, subquadrangulaire à trapézoïforme, plus court que les sépales latéraux, 6,5-9 (-11) × 8-13,5 mm (étalé), brun noirâtre, muni à la base de 2 petites gibbosités aiguës, les bords droits ou étalés, ornés d'une pilosité submarginale complète, assez longue, chamois clair; macule complexe, parfois très étendue; champ basal un peu plus pâle que le centre du labelle, brun à brun noirâtre; appendice verdâtre, assez développé, tridenté; cavité stigmatique relativement grande, souvent foncée, munie d'un ressaut horizontal et de pseudo-yeux arrondis, subpédonculés, luisants, vert noirâtre, cerclés de jaune verdâtre, reliés aux parois externes par des brides pourpres; points staminodiaux présents.

Floraison: IV-VI.

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, souvent marneux, secs à humides: talus, suintements des pelouses et des friches, pâtures humides, chênaies claires et leurs lisières, de 400 à 1.200 m d'alt.

Répartition: hauts bassins du Tigre et de l'Euphrate (Turquie) et régions limitrophes. Très localisé et assez rare.

Référence: p. 390 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient*: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.