



1-4 OPHRYS A
 Si: CANTANISSETTA, M^{te} SAMBUCO 20.IV.2000



HERBARIUM Pierre DELFORGE
 Orchidaceae

Ophrys archimedeae

P. DELFORGE & M. WALRAVENS 2000

Date: 20.IV.2000 N° 1000420A2
 Pays: Italie Région: Sicile
 Province: Enna Localité: Monte Sambuco
 Altitude: 680 m UTM_{WGS84}: 33SVB4441

Habitat: sur sables et blocs de grès, plantation incendiée d'*Eucalyptus* sp. et de *Pinus pinea* avec *Cistus* div. spp., *Spartium junceum*, ainsi qu'*Herorchis longicornu*, *Ophrys gargarica*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la clarification de la nomenclature dans la section *Pseudophrys* GODFREY 1928. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 256 [2000].

leg. & det. Pierre DELFORGE 2000

H O L O T Y P E

Ophrys archimedeae

P. DELFORGE & M. WALRAVENS

Descriptio holotypi: Herba procera robustaque. Flores pro grege Ophrydis subfuscae satis magni. Sepala lateralia viridia, 12 mm longa. Petala oblonga, 5 mm longa, flavovirentia. Labellum subhorizontale, ovatum, 13 mm longum, 12 mm latum, paulo convexum, trilobatum, centro badio, marginibus late luteis anguste glabrisque, lobo mediano parvo reflexoque. Macula basalis sublazulina, punctata, indivisa. Pilositas satis densa, satis ordinata, in zona macula proxima fuscior.

Holotypus: Sicilia, provincia Enna, Monte Sambuco (UTM: 33SVB4441), alt. s.m. 680 m, 20.IV.2000. Leg. P. DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub n° 1000420A2.

Isotypus: 18.IV.1997. In Herb. M. Walravens sub n°52-8.

Étymologie: *Archimedeus*, -a, -um, adjectif latin antique: d'Archimède, savant grec de Sicile (Syracuse, 287-212 AC).

Référence: DELFORGE, P. 2000. Contribution à la connaissance des *Ophrys* apparemment intermédiaires entre *Ophrys fusca* et *O. lutea* en Sicile. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 256.

Description: plante élançée et souvent robuste, haute de 15-30 (-35) cm; inflorescence lâche; 3-7 fleurs assez grandes; sépales longs de (9,5-) 11-14 mm; pétales longs de 4-5 (-6) mm, oblongs; labelle 10-15,5 × 9-14 mm (moyenne longueur/largeur 1,11; bord externe des lobes latéraux formant un angle de 30-45° avec l'axe longitudinal), peu convexe, de silhouette variée, étroitement à largement ovale, les sinus fermés, peu profonds; lobes latéraux arrondis, se rabattant un peu par-dessous, les bords réfléchis; lobe médian, réduit, étalé, réfléchi; pilosité labellaire centrale brune, assez dense, assez longue et ordonnée, bien délimitée ou se diluant en une zone progressivement rougeâtre vers les bords, contournant les sinus et débordant toujours sur le lobe médian, entourée par une couronne externe assez large de poils jaunes plus ébouriffés, parsemés de poils plus longs à extrémité blanchâtre; bord du labelle muni d'une étroite marge glabre, jaune, irrégulière; macule basale, assez étendue mais n'atteignant pas les sinus, grisâtre à laiteuse, subglabre, ponctuée à la base, parfois munie, au sommet, d'un large ω pâle, peu contrastant; dessous du labelle jaune d'or.

Floraison: IV-V.

Habitat: de pleine lumière à ombre, sur substrats alcalins, secs à frais: friches, garrigues, broussailles, pinèdes, jusqu'à 900 m d'alt.

Répartition: sicilienne. Localisé et assez rare.

Référence: p. 319 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.*