

HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys astypalaeica

P. DELFORGE

Date: 03.IV.1997 N° 09703

Pays: Grèce Région: Îles égéennes

Province: Cyclades Localité: île d'Astypaléia, Agh. Pentelimon

Altitude: 220 m UTM_{WGS84}: 35SMA3942

Habitat: sur pente de calcaire éocène avec éboulis, phrygana mousseuse, peu pâturée, à *Calicotome villosa*, *Euphorbia acantho-thamnos*, *Prasium majus*, *Salvia triloba*, *Sarcopoterium spinosum*, *Teucrium brevifolium*, *Thymus capitatus* avec *Helichrysum italicum*, *Ranunculus asiaticus*, *Tordylium apulum* et *Anacamptis pyramidalis*, *Anteriorchis fragrans*, *Ophrys aeoli*, *O. attaviria*, *O. ferrum-equinum*, *O. iricolor*, *O. leochroma*, *O. omegaiifera*, *O. parosica*, *O. cf. pelinaea*, *O. sicala*, *Vermeuleniana papilionacea* var. *aegaea*.

Publication: DELFORGE, P. - Description d'*Ophrys aeoli*, d'*Ophrys astypalaeica* et d'*Ophrys thesei*, trois nouvelles orchidées des Cyclades (Grèce). *Natural. belges* 78 (Orchid. 10): 154 [1997].

leg. & det. Pierre DELFORGE 1997

H O L O T Y P E



0
1
2
3
4
5
cm

Ophrys astypalaeica

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba robusta, 36 cm alta. Caulis valde crassus. Folia basilaria magna, 4, satis erecta; folia caulinaria 2, longe caulem vaginantes quod non est commune in sectionem Pseudophrydis. Inflorescentia satis densa. Flores 6, pro subgrege Ophrydis iricoloris parvi. Sepala 9 mm longa, 6 mm lata, viridia. Petala 6,5 mm longa, 2 mm lata, viridia atro brunneo suffusa. Labellum 15 mm longum et 12 mm latum. Ophrydi iricolori similis sed habitus robustior, folia majores, flores minores, labelli pagina inferiora rubra viridi late cincta. Floret in Martio usque ad initio Aprilis, paulum post Ophrydem iricolorem.

Holotypus: Graecia, provincia Dodecanissa (districtus phytogeographicus Cyclades), insula Astypalaea, apud Agios Pentelimon (UTM: 35SLA3942), alt. s.m. 220 m, 3.IV.1997. Leg. P. DELFORGE. In herb. Pierre Delforge sub n° 9703.

Étymologie: *Astypalaeicus*, -a, -um: d'Astypaléia, île du Dodécanèse (Grèce) qui fait partie de l'archipel des Cyclades au sens phytogéographique du terme.

Référence: DELFORGE, P. 1997.- Description d'*Ophrys aeoli*, d'*Ophrys astypalaeica* et d'*Ophrys thesei*, trois nouvelles Orchidées des Cyclades (Grèce). *Natural. belges* 78 (Orchid. 10): 154.

Description: comme *Ophrys iricolor* mais plante robuste et élancée, haute de 15-40 cm, généralement munie de grandes feuilles basilaires subdressées et de 1-2 grandes feuilles caulinaires longuement engainantes; inflorescence assez dense; (3-) 4-8 fleurs relativement petites; sépales 8-11,5 × 4,5-7 mm; pétales 6,5-9 × 1,8-2,7 mm; labelle 12-17 × 9-15 mm, horizontal à subhorizontal, presque aussi vivement coloré qu'*O. iricolor*; bords du plateau basal verts ou lavés de rougeâtre; dessous du labelle toujours muni d'un large centre rougeâtre bordé ± largement de vert jaunâtre; macule bleuâtre, moins irisée et moins vive.

Floraison: finIII-IV; en même temps qu'*O. iricolor* ou un peu après lui.

Habitat: en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs à frais; phryganas à *Sarcopoterium spinosum*, jusqu'à 230 m d'alt.

Répartition: endémique de l'île d'Astypaléia (Dodécanèse, mais île appartenant géographiquement aux Cyclades). Très localisé et rare.

Référence: p. 359 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.*