

Ophrys caesiella

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba compacta, 10 cm alta. Inflorescentia densa. Flores 2, pro grege Ophrydis fuscae medii vel satis parvi. Sepala lateralia subviridia, 10 mm longa. Petala oblonga, 7 mm longa, viridia. Labellum subhorizontale, trilobatum, 10,5 mm longum, 9 mm latum, cum pilositate densa, satis inordinata, atroviolacea; margo labelli glabratis, irregularis angustaque. Macula evoluta, caesiella, subglabra, per lineam pilorum albidorum de base usque ad centrum divisa. Floret a medio Februarii usque ad finem Martii.

Holotypus: Melita, apud Red Tower (UTM: 33SVV4081), alt. s.m. 70 m, 22.II.1993. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09303A.

Étymologie: *caesiellus*, -a, -um, gris bleuâtre, allusion à la couleur de la macule.

Référence: DELFORGE, P. 2000. *Ophrys caesiella* sp. nova, une espèce maltaise du groupe d'*Ophrys fusca*, présente aussi en Sicile. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 233.

Description: plante assez grêle, haute de (5-) 10-20 (-22) cm; inflorescence dense; (1-) 2-6 fleurs assez petites à moyennes; sépales latéraux longs de 8,5-11 mm; pétales 4,5-6 × (0,7-) 1,8-2,5 mm, vert parfois olivâtre, plus foncés que les sépales, labelle, de tonalité générale plutôt terne, subhorizontal à pendant à 45°, (9-) 10-12,5 (-13) × (8-) 9-11 (-12) mm (étalé; moyenne longueur/largeur 1,17; bord externe du lobe latéral du labelle formant un angle assez fermé, de 22-28° avec l'axe longitudinal), assez convexe transversalement, muni de mammosités faibles, basales, induisant une faible courbure longitudinale; lobes latéraux à sinus bien marqués, les bords rabattus; lobe médian souvent important, long de 2-4 mm, largement cunéiforme; pilosité labellaire longue, assez désordonnée, violacé sombre, sans zonation, parfois irrégulièrement distribuée; macule allongée, atteignant et dépassant souvent les sinus, gris bleuâtre, parfois marbrée d'indigo, rarement bilunulée au sommet ou bissectée, munie d'une pilosité rase, raide, régulière, souvent éparse; bord du labelle étroit, glabre, de contour irrégulier, jaunâtre à verdâtre; cavité stigmatique dépourvue d'ornementation; base de la cavité stigmatique et gorge munies d'une pilosité blanchâtre, descendant généralement, par un sillon peu marqué, jusqu'au centre de la macule; dessous du labelle blanc verdâtre, parfois lavé de brun ou de pourpre.

Floraison: (I-) II-IV, assez précoce.

Habitat: en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs: friches, garrigues, broussailles, jusqu'à 800 m d'alt.

Répartition: Sicile et archipel maltais. Très localisé et parfois assez abondant.

Pollinisateur: *Andrena flavipes*.

Référence: p. 351 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.*

holotype



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys caesiella
P. DELFORGE 2000

Date: 22.II.1993 N° 09303A

Pays: Malte

Localité: île de Malte, Marfa Ridge, Red Tower

Altitude: 70 m UTM_{WGS84}: 33SVV4081

Habitat: garrigue à *Thymus capitatus* avec *Olea europaea* var. *oleaster*, *Ceratonia siliqua* ainsi que *Vermeulenia collina*.

Publication: DELFORGE, P. - *Ophrys caesiella* sp. nova, une espèce maltaise du groupe d'*Ophrys fusca*, présente aussi en Sicile. *Natural. belges* 87 (Orchid. 13): 233 [2000].

leg. & dét. Pierre DELFORGE 1993 & 2000

H O L O T Y P E



9303