



HERBARIUM Pierre DELFORGE  
Orchidaceae

*Ophrys calocaerina*

J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS 1994

Date: 8.IV.1991 N° 09114  
Pays: Grèce Région: Sterea-Ellada  
Province: Béotie Localité: Delphes  
Altitude: 520 m UTM<sub>wgs84</sub>: 34SFH3360

Habitat: lisière d'olive avec *Himantoglossum robertianum*,  
*Ophrys sicula*, *O. ferrum-equinum*, *O. mammosa*, *O. pseudospruneri*,  
*O. spruneri*.

Publication: DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J. - Essai  
d'analyse systématique du genre *Ophrys*. *Natural. belges* 75  
(Orchid. 7 suppl.): 374 [1994].

leg. Pierre DELFORGE 1991

H O L O T Y P E

*Ophrys calocaerina*

J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS

**Descriptio:** Herba pro genere media. Flores pro genere et pro grege Ophrydis fuscae magni, Ophrydem lupercalem aequans vel superans, Ophrydem zonatam multo superans, labello 15-18 mm longo, de fauce ad apicem, 12-15 mm lato. Sepala petalaeque viridia. Pilositas labelli bicolor, cum zona maculae proxima pallidiore et zona margini proxima fuscata, ad instar Ophrydis zonatae pilositate, sed macula centralis, hyalina metallicaque, per lineam glabratam divisa.

**Holotypus:** Graecia, regio Sterea Ellada (Phocis), nomos Viotia, Delphi, alt. s.m. 520 m. 21.IV.1991. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09114.

**Étymologie:** *calocaerinus*, -a, -um: adjectif latinisé, du grec *kalo-kairinos*, -è, -on, de la belle saison; allusion à la floraison tardive, pré-estivale pour les orchidées de la région.

**Référence:** DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J. 1994.- Essai d'analyse systématique du genre *Ophrys*. *Natural. belges* 75 (Orchid 7 suppl.): 374.

**Description:** plante élancée, haute de 20-42 (-50) cm; jusqu'à 10 fleurs grandes; sépales 11-15 × 5,5-7 mm; pétales 8,5-10 × 2,5-3,5 mm; labelle pendant, allongé, 15-20 × 13,5-16 mm (étalé; moyenne longueur/largeur 1,42; bord externe du lobe latéral du labelle formant un angle de 20-30° avec l'axe longitudinal), convexe transversalement, faiblement convexe longitudinalement, les bords fortement rabattus par dessous; lobes latéraux cunéiformes, assez anguleux (étalés), paraissant arrondis sur le frais, les sinus triangulaires, profonds; lobe médian allongé; pilosité labellaire longue, brun marron, assez ordonnée, munie d'une zonation claire, rougeâtre, assez nette, ceinturant largement la macule; macule subglabre, allongée, bissectée par un sillon profond, subglabre dans la moitié distale, formée de 2 taches luisantes, gris métallique, largement bordée de rougeâtre et, au sommet, de 2 lunules floues, plus pâles, bleuâtres, peu contrastantes; bord du labelle étroit, peu visible, de contour irrégulier, jaunâtre; dessous du labelle vert clair.

**Floraison:** IV-V, assez tardive.

**Habitat:** en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs et frais: friches, phryganas, garrigues, broussailles probablement jusqu'à 700 m d'alt.

**Répartition:** hellénique; Grèce continentale orientale, Péloponnèse, îles d'Eubée et de Cythère. Très localisé et parfois assez abondant.

**Pollinisateur:** *Andrena labialis*.

**Référence:** p. 345 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4<sup>e</sup> éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.