



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys cythnia

P. DELFORGE & C. ONCKELINX 2014

Date: 28.III.2014 N° 11402
Pays: Grèce Région: Cyclades
Île: Kythnos Localité: Isodia tis Theotokou
Altitude: 200-210 m UTM_{WGS84}: 35SKB7046

Habitat: Pâturage abandonnée avec régénération de phrygana à *Sarcopoterium spinosum* avec *Ophrys ferrum-equinum*, *Serapias bergonii*, *Vermeulenella collina*, *V. papilionacea* var. *aegaea*.

Publication: DELFORGE, P. & ONCKELINX, C. - Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Kythnos (Cyclades occidentales, Grèce). *Natural. belges* 95 (Orchid. 27) [2014]: 203.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2014

H O L O T Y P E

Ophrys cythnia

P. DELFORGE & C. ONCKELINX

Descriptio holotypi: Herba erecta, satis gracilis, ad 33 cm alta. Flores 2, alabastra 3, pro grege Ophrydis luteae submedii. Sepala lateralia viridia 10 mm longa (in exsiccatio). Petala oblonga, 4,8 mm longa. Labellum 10 × 9 mm (in statu explanato desiccatoque), cuneiforme, sulcatum, mammosum, plus minusve geniculatumque ad basin, rotundum, trilobatum, centro fusco, marginibus late luteis glabrisque; lobus medianus parvus, emarginatus, cum pilis eburneis longioribus ad basin. O. galilaeae, O. phryganae et O. siculae affinis sed labelli directio genuflexioque variae et labellum mammosius ad basin, pilosiusque in centro.

Holotypus: Graecia, Cyclades, insula Cythnos, loco dicto Isodia tis Theotokou (UTM_{WGS84}: 35SKB7046), alt. s.m. 200-210 m, 28.III.2014. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 11402.

Étymologie: *Cythnius*, -a, -um: de [l'île de] Kythnos.

Référence: DELFORGE, P. & DELFORGE-ONCKELINX, C. 2014.- Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Kythnos (Cyclades occidentales, Grèce). *Natural. belges* 95 (Orchid. 27): 203.

Description: plante élancée, jusqu'à 35 cm de hauteur; inflorescence compacte; 3-8 fleurs petites à moyennes; labelle 8,5-12,5 × 7,5-12,5 mm (rapport longueur/largeur 1-1,2; bord externe du lobe latéral du labelle formant un angle moyen de 43° avec l'axe longitudinal), présentant des courbures diverses à la base, de peu à très genouillé, horizontal à descendant; mammosités maculaires très massives, limitées par une cassure transverse abrupte; bord du labelle largement jaune, peu relevé, le sommet des lobes latéraux recouvrant souvent la base du lobe médian; macule importante, glabrescente, entourée d'un fuseau de pilosité brune souvent très réduit, nettement démarqué de la pilosité maculaire, se prolongeant rarement dans le lobe médian, avec peu de dilution orangée marginale; présence fréquente, entre le sommet de la macule et la base du lobe médian, d'une touffe de poils blanchâtres, raides, assez longs.

Floraison: III-miIV.

Habitat: en pleine lumière, surtout sur substrats schisteux; phryganas herbeuses, jusqu'à 300 m d'alt.

Répartition: paraît endémique de l'île de Kythnos, mais probablement aussi sur d'autres îles des Cyclades. Assez localisé et rare.

Référence: p. 315 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.