



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys flammeola
P. DELFORGE 2000

Date: 19.IV.2000 **N°** 1000419A5
Pays: Italie **Région:** Sicile
Province: Caltanissetta **Localité:** Monte Formaggio
Altitude: 340 m **UTM_{WGS84}:** 33SVB3224

Habitat: pineraie et plantation d'*Eucalyptus* sp. avec *Himantoglossum robertianum*, *Herorchis longicornu*, *Ophrys bertolonii*, *O. bombyliflora*, *O. incubacea*, *O. lunulata*, *O. lutea*, *O. oxyrrhynchos*, *O. sicula*, *Orchis italica*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la clarification de la nomenclature dans la section *Pseudophrys* GODFREY 1928. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 256 [2000].

leg. & det. Pierre DELFORGE 2000

H O L O T Y P E



OPHRYS A5
Si CATANIA
1^{re} FORMAGGIO
19.IV.2000

FLAMMEOLA

Ophrys flammeola

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba robusta multifloraque. Flores pro grege Ophrydis subfuscae satis magni. Sepala lateralia viridia, 11,5 mm longa. Petala oblonga, 8 mm longa subspathulata, flavovirentia. Labellum subhorizontale, ovatum, 14 mm longum, 12 mm latum, cuneiforme ad basin, paulo convexum, profunde trilobatum, centro fusco, marginibus anguste flavovirentibus irregulariter glabrisque, lobo mediano magno, emarginato reflexoque. Macula basalis atrolazulina, subglabre, gibbosa, divisa. Pilositas densa, satis inordinata.

Holotypus: Sicilia, provincia Caltanissetta, Monte Formaggio (UTM: 33SVB3224), alt. s.m. 340 m, 19.IV.2000. Leg. P. DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub n° 1000419A5.

Étymologie: *flammeolus*, -a, -um, adjectif latin antique: qui a les couleurs de la flamme.

Référence: DELFORGE, P. 2000. Contribution à la connaissance des *Ophrys* apparemment intermédiaires entre *Ophrys fusca* et *O. lutea* en Sicile. *Natural. belges* 81 (Orchid. 13): 256.

Description: plante robuste, haute de 18-35 (-41) cm; inflorescence assez dense; 3-9 fleurs assez grandes; sépales longs de 10,5-16 mm; pétales longs de 6-8,5 mm; labelle horizontal, étroitement à parfois largement ovale, 11-16,5 × (8-) 10-14 mm (moyenne longueur/largeur 1,20; bord externe des lobes latéraux formant un angle de 40-47° avec l'axe longitudinal), assez convexe transversalement, peu convexe et souvent sinué longitudinalement par une dépression centrale, la base genouillée ou gonflée par des reliefs longitudinaux saillants; sinus profonds et ouverts; lobes latéraux falciformes; lobe médian étalé, important, parfois largement cunéiforme, plus souvent carré à la base, puis largement obcordiforme au sommet; pilosité labellaire centrale brun foncé, parfois violacée, assez dense, longue et désordonnée, entourant la macule, devenant ± largement rougeâtre vers les bords, frôlant les sinus et débordant toujours sur le lobe médian, entourée d'une très étroite ceinture externe de poils jaunes ou paille; bord du labelle ± réfléchi, muni d'une marge glabre très étroite, fort irrégulière; macule bleu grisâtre foncé, glabrescente, nettement bilunulée au sommet en fin de floraison, n'atteignant pas les sinus; cavité stigmatique relativement petite, munie à la base d'une importante pilosité blanche; dessous du labelle jaune à jaune verdâtre.

Floraison: IV-V.

Répartition: sicilienne. Localisé et parfois abondant.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs: friches, pâtures, garrigues, broussailles et leurs lisières, jusqu'à 700 m d'alt.

Pollinisateurs: *Andrena florentina* et *A. thoracica*.

Référence: p. 320 in DELFORGE, P. 2016.- *Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient*: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.