



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys leochroma P. DELFORGE 2005

Date: 4.IV.2005 N° 10504

Pays: Grèce Région: Crète

Province: Lassithi Localité: Schinokapsaia

Altitude: 250 m UTM_{wgs84}: 35SLU9778

Habitat: Sur pouddingue à ciment calcaire, pinède claire à *Pinus halepensis* avec *Asphodeline lutea* et *Himantoglossum robertianum*, *Limodorum abortivum*, *Ophrys creberrima*, *O. cretica*, *O. episcopalis*, *O. iricolor*, *O. sicula*, *Orchis anthropophora*, *O. italica*, *Serapias bergonii*, *S. orientalis*

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la connaissance du groupe d'*Ophrys tenthredinifera* dans le bassin méditerranéen oriental; *Natural. belges* 86 (Orchid. 18): 112.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2005

H O L O T Y P E

Ophrys leochroma

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera robustaque. Flores pro grege Ophrydis tenthrediniferae magni. Sepala lateralia purpurea, 13 mm longa. Labellum dessicatum 13,4 × 17,2 mm, subquadratum-rotundatum, paulum trapezoidum, integrum, in statu vivo valde transversaliter convexum, centro fusco, velveto, satis lato, periphèria corona pilositatis densae, longae, sercicae, leochromae late ornata, sine pilis longioribus supra appendicem. Appendix rotundata, erecta, in lacinia alta insertata. Macula basalis, parva. Area basalis labelli atrirubra, parva, valde incurvata. Cavitas stigmatica atrifusca. Puncti staminodiales absentes. Floret satis sero, a fino Martii usque ad initium Maii.

Holotypus: Graecia, Creta, provincia Lassithi, prope Schinorapsaia (UTM: 35SLU9778), alt. s.m. 250 m, 4.IV.2005. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10504.

Étymologie: *leochromus*, -a, -um (λεων: lion; χρωμα: couleur): jaune fauve, de la couleur du pelage du lion; allusion à la couleur de la pilosité marginale du labelle, qui rappelle souvent, par son aspect et sa couleur, une crinière.

Référence: DELFORGE, P. 2005.- Contribution à la connaissance du groupe d'*Ophrys tenthredinifera* dans le bassin méditerranéen oriental. *Natural. belges* 86 (Orchid. 18): 112.

Description: plante robuste; 2-8 fleurs moyennes à grandes, souvent de teinte foncée; sépales très arrondis, rosâtres à pourpre soutenu, 11-14,4 × 6-7,7 mm, parfois rabattus en arrière; pétales concolores mais souvent un peu plus foncés, 3,9-6 mm de longueur, dirigés vers l'avant; labelle massif, trapézoïdal-arrondi, 10,3-14,6 × 12,9-16,2 mm, la base carrée, gonflée par 2 gibbosités arrondies, glabres, le centre velouté, obcordiforme, brun foncé à noirâtre, largement bordé d'une pilosité dense, jaune à plus souvent fauve ou brune, amincie dans la moitié distale, composée pour partie de longs poils blanchâtres à miel; parfois 2 petites touffes de poils peu développées de part et d'autre de l'appendice; cavité stigmatique relativement petite, brun sombre à noirâtre, munie de callosités externes assez marquées et de callosités internes courbes, importantes, très brillantes, induisant un fort ressaut au-dessus du champ basal; champ basal assez court, brun sombre à rouge noirâtre, plus clair vers la macule; macule nette, bien marquée, relativement grande, bidentée.

Floraison: (finII-) miIII-miV, tardif, souvent la dernière espèce du groupe à fleurir en Grèce.

Habitat: surtout en pleine lumière, sur substrats alcalins à un peu acides, secs à frais; phryganas, garrigues, broussailles, jusqu'à 1.000 m d'alt.

Répartition: hellénique; Crète, îles du bassin égéen et ses marges, Péloponnèse; localisé et parfois abondant.

Pollinisateur: *Eucera kullenbergi*.

Référence: p. 309 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.