



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys masticorum

P. DELFORGE & SALIARIS 2007

Date: 23.IV.2007 **N°** 10709A
Pays: Grèce **Région:** Îles égéennes
Province: Chios **Localité:** île de Chios, Elata
Altitude: 160 m **UTM_{wc84}:** 35SMC0937

Habitat: entre masticos, friche claire avec *Cistus parviflorus*, *Sarcopoterium spinosum*, *Spartium junceum* avec *Himantoglossum robertianum*, *Ophrys parosica* var. *parosica*, *O. sicula*, *Orchis anatolica*, *O. italica*, *O. sancta*.

Publication: DELFORGE, P & SALIARIS, P.A. - Contribution à la connaissance des Orchidées des îles de Chios, Inousses et Psara (Nomos Chiou, Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* 88 (Orchid. 20): 177-178 [2007].

leg. & det. Pierre DELFORGE 2007

H O L O T Y P E

Ophrys masticorum

P. DELFORGE & P.A. SALIARIS

Descriptio holotypi: Herba gracilis, 21 cm alta in statu vivo. Bractea inferiora flore superans. Flores 3, pro genere et grege Ophrydis oestriferae satis parvi. Sepala rosea, dorsalum supra columnam inclinatum, lateralia patentia, 12,5 mm longa in exsiccata, 1/4 longiora quam labellum. Petala rosea, triangulata, pro grege parvi, 2,5 mm longa in exsiccata. Labellum fuscum, trilobatum, sub-horizontale, 8,4 mm longum quando dessiccatum, lobis lateralibus extra villosis, gracilibus, cornutis, gibbis divergentis 3,7 mm longis, lobo centrali globosi, transverse valde convexi ut attenuati in apice videtur, peripheria pilositate bubalina regulariter ornat. Area basilaris labelli xerampelina. Macula centralis satis simplex, H-formis, eburneo marginata. Appendix tridentata. Puncti staminodiales praesentes. Gynostemium longe acuminatum. Ovarium elongatum. Floret satis sero, a (medio-) fine Aprili usque ad finem Maji, post alias species gregis oestriferae Chii.

Holotypus: Graecia, insula Chios, prope Elata (UTM: 35SMC0937), alt. s.m. 160 m, 23.IV.2007. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10709a.

Étymologie: *masticorum*: des masticos (vergers d'arbres à mastix, *Pistacia lentiscus* cv. *chia*); allusion à la répartition actuellement connue de l'espèce, qui s'étend sur le territoire de la commune de Mastichochoia (Chios), et à ses stations qui se situent souvent dans les masticos ou à leur voisinage.

Référence: DELFORGE, P. & SALIARIS, P.A. 2007.- Contribution à la connaissance des Orchidées des îles de Chios, Inousses et Psara (Nomos Chiou, Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* 88 (Orchid. 20): 177-178.

Description: plante haute de 15-37 (-80) cm; inflorescence très lâche; 5-15 fleurs petites à assez petites; sépales roses à lilas 10,5-15 × 5-8 mm, le dorsal plus long que le labelle, souvent rabattu sur le gynostème (91%); pétales concolores, 1,5-3,5 × 1-2 mm; labelle subhorizontal, petit par rapport aux sépales, long de 7,5-11,5 mm, brun rougeâtre foncé à pourpre noirâtre, pourvu d'une pilosité submarginale complète, chamois clair à grisâtre brillant, rarement atténuée dans les quarts latéro-distaux; lobe médian subglobuleux, paraissant atténué dans la partie distale, ses bords latéraux fortement enroulés (vue de profil, la partie inférieure du lobe médian est rectiligne); macule assez simple; lobes latéraux effilés, divergents, longs de 2,4-9 mm; champ basal rougeâtre, assez clair à foncé, souvent concolore avec le centre du labelle; gynostème allongé, très acuminé, le sommet surplombant le centre du lobe médian.

Floraison: miIV-V, tardive.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats calcaires, secs à frais: phrygas, garrigues, zones herbeuses des masticos et des olivaias, broussailles, jusqu'à 250 m d'alt.

Répartition: égéenne orientale; îles grecques de Lesbos et de Chios. Localisé et parfois abondant dans ses stations.

Référence: p. 409 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.