



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys pelinaea P. DELFORGE 2007

Date: 30.IV.2007 N° 10712

Pays: Grèce Province: Chios

Localité: île de Chios, Viki (mont Pélinaion)

Altitude: 600 m UTM_{WGS84}: 35SMC1369

Habitat: broussailles herbeuses à *Acer monspessulanum*, *Euphorbia rigida*, *Pinus halepensis*, *Pyrus amygdaliformis*, *Quercus coccifera*, *Sarcopoterium spinosum* avec *Ophrys dodekanensis*, *O. siula*, *Orchis anatolica*, *O. intacta*, *O. provincialis*, *Serapias bergonii*.

Publication: DELFORGE, P & SALIARIS, P.A.. - Contribution à la connaissance des Orchidées des îles de Chios, Inousses et Psara (Nomos Chiou, Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* 88 (Orchid. 20): 41-227 (description p. 177).

leg. & det. Pierre DELFORGE 2007

H O L O T Y P E



Ophrys pelinaea

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba satis gracilis, 18 cm alta. Flores 3, pro grege Ophrydis attaviriae medii. Sepala lateralia viridia, 12 mm longa. Petala oblonga, 8 mm longa flavovirentia paulum githaginoso. Labellum 13 × 10 mm (dessicatum), cuneiforme sulcatumque ad basin, longitudinaliter paulum convexum, transverse valde convexum, satis profunde trilobatum, pilositate fusco, satis denso ordinatoque, marginibus anguste flavis regulariter glabrisque, lobo mediano magno, leviter emarginato. Macula basalis cretacea, in centro paulum rubrifusco marmorata, subglabre, indivisa, in parte distale diluto caesio cincta, litteram « O » formans.

Holotypus: Graecia, insula Chios, mons Pelinaeus (UTM: 35SMC1369), alt. s.m. 600 m, 30.IV.2007. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10712.

Étymologie: *Pelinaeus*, -a, -um: du [mont] Pélinaion, point culminant de l'île de Chios, sur les contreforts duquel a été prélevé le type.

Référence: DELFORGE, P. & SALIARIS, P.A. 2007.- Contribution à la connaissance des Orchidées des îles de Chios, Inousses et Psara (Nomos Chiou, Égée orientale, Grèce). *Natural. belges* 88 (Orchid. 20): 177.

Description: plante trapue, haute de 8-22 cm; 2-5 fleurs assez grandes; sépales 11-16 × 5-9 mm; pétales longs de 7-10 mm; labelle 13-20 × 10-15 mm (bord externe du lobe latéral formant un angle de 27-34° avec l'axe longitudinal), subhorizontal, la base peu genouillée, nettement creusée en V, les lobes latéraux et médian peu convexes, évoquant alors ceux d'*Ophrys punctulata*, ou, plus souvent, très convexes, évoquant alors ceux d'*O. omegaifera*, bordés d'une fine marge glabre jaune; pilosité labellaire uniforme, dense, longue, dressée, parfois ébouriffée, très foncée, noir violacé, souvent sans reflets givrés, se décolorant fréquemment irrégulièrement après l'anthèse; macule atteignant le niveau des sinus, rougeâtre à bleu violacé, souvent laiteuse et marbrée, le sommet généralement orné d'un O blanchâtre, large, contrastant, généralement non bissectée ou bissectée par un léger sillon peu marqué; dessous du labelle vert blanchâtre.

Floraison: milIII-IV, assez tardive.

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs à frais: friches, phryganas, garrigues, broussailles, pinèdes claires, jusqu'à 700 m d'alt.

Répartition: surtout îles orientales de l'Égée médiane et méridionale, et probablement Crète. Localisé et assez rare.

Pollinisateur: *Andrena gravida*.

Référence: p. 336 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.