



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys scyria

P. DELFORGE & C. ONCKELINX 2013

Date: 21.III.2011 **N°** 11107
Pays: Grèce **Région:** Sporades du Nord
Province: Eubée **Localité:** Skyros, Ormos Gyrismata
Altitude: 10 m **UTM_{WGS84}:** 35SKD8912

Habitat: Sur dépôts néogènes, phrygana à *Astragalus* sp., *Sarcopoterium spinosum*, *Thymus capitatus*, *Thymelea tartonraira* avec *Ophrys achillis*, *O. sicula*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Skyros (Spor(ades du Nord, Grèce). *Natural. belges* 94 (Orchid. 26) [2013]: 238.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2011, 2013

H O L O T Y P E



Ophrys scyria

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, satis gracilis, ad 10 cm alta (17 cm alta in statu vivo). Flores 3, pro grege Ophrydis omegaiferae medii. Sepala lateralia viridia 13 mm longa (in exsiccatum). Petala oblonga, 7 mm longa. Labellum 12 × 8,5 mm (desiccatum), brunneum, sulcatum ad basin. Macula basalis, fusca, subglabra, indivisa, in parte distale late caeruleo cincta, litteram «W» formans. Cavitas stigmatica transversalis, 3,6 mm lata et 1,9 mm alta. *O. omegaiferae* affinis sed labellum sulcatum ad basin et cavitas stigmatica magis latior quam alta.

Holotypus: Graecia, insula Scyros, prope Ormos Gyrismata. 5-10 m (UTM: 35SKD8912), alt. s.m. 10 m, 21.III.2011. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 11107.

Étymologie: *Scyrius*, -a, -um: de [l'île de] de Skyros (orthographié Scyros en latin classique et parfois en français également).

Référence: DELFORGE, P. 2013.- Contribution à la connaissance des Orchidées de l'île de Skyros (Sporades du Nord, Grèce). *Natural. belges* 94 (Orchid. 26): 238.

Description: plante haute de 13-27 cm; inflorescence lâche; 3-5 fleurs paraissant proches de celles d'*Ophrys omegaifera* mais labelle (étalé) 14,5-20 × 13-21 mm, moins genouillé à la base, subhorizontal à descendant ou pendant, muni d'une pilosité brun marron clair ou brun orangé, assez ébouriffée, le sommet des poils un peu grisâtre; lobes médian et latéraux du labelle assez à très fortement convexes transversalement et, souvent aussi, longitudinalement; macule basale importante, munie d'une pilosité rase, atteignant souvent le niveau des sinus des lobes latéraux, verdâtre puis brun marron à la base, bleu noirâtre ou bleuâtre et marbrée dans sa moitié distale, le sommet limité par un Ø bleu pâle vif, ± fin; base du labelle nettement creusée d'un sillon en V large et peu profond, prolongé par un faisceau libéro-ligneux visible sur la face supérieure du labelle jusqu'au sommet du lobe médian; cavité stigmatique très basse, transverse, large de 3,5-5 mm, haute de 1,8-3 mm (large de 3-5 mm et haute de 4-5 mm chez *O. omegaifera*), la base munie d'une brosse jugulaire blanche.

Floraison: milIII-IV.

Habitat: en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs: friches, phryganas, broussailles, pinèdes claires, jusqu'à 400 m d'alt.

Répartition: probablement endémique de l'île de Skyros. Extrêmement localisé et rare.

Référence: p. 337 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.