

Ophrys ulyssea

P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque. Flores pro grege Ophrydis tenthrediniferae parvi. Sepala lateralia rosea, 9,7 mm longa. Labellum dessicatum 8,2 × 10,4 mm, subquadratum-rotundatum, valde trapezoidum, integrum, in statu vivo valde transversaliter convexum, centro atrifusco, velveto, exiguo, peripheria late corona pilositatis densae, satis longae, sericeae, chlorinae ornata, cum pillis longioribus, rubescens, supra appendicem. Appendix triangularis, erecta, in lacinia parva insertata. Macula basalis, parva. Area basalis labelli ferruginea, parva, paulum incurvata. Cavitas stigmatica fusca. Puncti staminodiales absentes. Floret satis sero, a fino Martii usque ad fino Aprili.

Holotypus: Graecia, Ioniae Insulae, insula Cephallenia, prope Kampitsata (UTM: 34SDH 7720), alt. s.m. 90 m, 5.IV.1991. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° ana910405b.

Étymologie: *Ulyseus*, -a, -um: d'Ulysse. Espèce dédiée au héros homérique, époux de Pénélope, père de Télémaque, roi d'Ithaque, mais probablement né à Céphalonie (disent les Céphaloniens).

Référence: DELFORGE, P. 2005.- Contribution à la connaissance du groupe d'*Ophrys tenthredinifera* dans le bassin méditerranéen oriental. *Natural. belges* 86 (Orchid. 18): 112.

Description: plante assez petite; inflorescence dense; 3-6 fleurs assez petites; sépales blanchâtres à roses ou lilas, 8,7-12,8 × 5-8,6 mm; pétales concolores, 2-4,5 × 2-3,7 mm, labelle 7,5-12,2 × 9,9-15,7 mm, souvent très convexe transversalement, largement trapézoïdal-arrondi (étalé), les épaulements étroits mais bien marqués, muni de gibbosités arrondies nettes; pilosité labellaire marginale hirsute, parfois laineuse, un peu plus développée près de l'appendice, jaune verdâtre assez vif à blanchâtre, rarement brunâtre clair, très large, ne laissant qu'une plage centrale exigüe, subquadrangulaire à losangée ou obcordiforme, brune à noirâtre; macule étroite, bidentée; appendice inséré dans une échancrure peu profonde; cavité stigmatique transverse, pourpre noirâtre, pourvue de 2 crêtes obliques arrondies, surplombant le champ basal; champ basal concolore, rougeâtre plus clair à proximité de la macule.

Floraison: finIII-IV.

Habitat: de pleine lumière à ombre, sur substrats alcalins à neutres, secs à frais: pelouses, phryganas, garrigues, broussailles, lisières, pinèdes claires, probablement jusqu'à 500 m d'alt.

Répartition: grecque ionienne: archipel ionien et zones continentales limitrophes; atteint probablement le Péloponnèse. Localisé et assez rare, répandu dans l'île de Zante (Zakynthos).

Pollinisateur: *Eucera bidentata*.

Référence: p. 306 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4^e éd., 544p. Les guides Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.



0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200



holotype
a b
OPHRYIS TENTHREDINIFERA GR. IONIE
KEPHALONIA. AGIA IRINI (a) KARAVOMILOS (b) 5.IV.1991
KAMPITSATA

HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys ulyssea
P. DELFORGE 2005

Date: 5.IV.1991 N° 0910405b
Pays: Grèce Région: îles Ioniennes
Province: Céphalonie Localité: Kampitsata
Altitude: 90 m UTM_{WGS84}: 34SDH7720

Habitat: sur marnes avec suintements, anciennes terrasses de cultures envahies par une phrygana très ouverte à *Sarcopoterium spinosum* avec *Spartium junceum* et *Ophrys bombyliflora*, *O. cephalonica*, *O. ferrum-equinum*, *O. gottfriediana*, *O. herae*, *O. leucadica*, *O. lutea*, *O. mammosa*, *O. phryganae*, *O. sicula*, *O. spruneri*, *O. gottfriediana* × *O. spruneri*, *Orchis italica*, *Paludorchis laxiflora*, *Serapias bergonii*, *S. lingua*.

Publication: DELFORGE, P. - Contribution à la connaissance du groupe d'*Ophrys tenthredinifera* dans le bassin méditerranéen oriental; *Natural. belges* 86 (Orchid. 18): 112 [2005].

leg. & dét. Pierre DELFORGE 1991

H O L O T Y P E

