



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys x borakisiana

P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER 1984

[*Ophrys attaviria* D. RÜCKBRODT & D. WENKER × *Ophrys mammosa* DESFONTAINES]

Date: 15.IV.1984 N° 08401

Pays: Grèce Région: Dodécannèse

Province: Rhodes Localité: Kritinia

Altitude: 200 m UTM_{WGS84}: —

Habitat: pinède claire à *Pinus brutia* et phrygane avec *Anacamptis pyramidalis* var. *brachystachys*, *Anteriorchis fragrans*, *Ophrys attaviria*, *O. mammosa*, *O. polyxo*, *O. regis-ferdinandii*, *O. sicula*, *Serapias bergonii*.

Publication: DELFORGE, P. & DELFORGE, C. - *Ophrys x borakisiana* hybr. nat. nov. *L'Orchidophile* 15(63) [1984]: 685-688.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1984

H O L O T Y P E

DELFORGE
rt, 3

B-1640 RHODE-SAINT-GENÈSE

Ophrys x borakisiana

P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER

(*Ophrys attaviria* D. RÜCKBRODT & D. WENKER × *Ophrys mammosa* DESFONTAINES)

Descriptio holotypi: Planta statura intermedia, ad 28 cm alta, proceras sed cum spica brevi. Flores medii, 5. Sepala intermedia, viridia, marginibus recurvatis; sepalum medianum supra columnam curvatum; sepala lateralia patula, leviter purpurei maculatis. Petala patula, intermedia. Labellum convexum, positione saepe directa, obscure quadrilobatum, leviter mammosum cum pilis albidis, fuscum, marginibus patulis colore rubrifusco cum limbo luteo. Macula caerulea H-formis. Cava stigmatica intermedia, fusca, rotunda sed V-formis cum pilis albidis in fundo. Appendix absens.

Holotypus: Graecia, insula Rhodus, ad vicum Kritinia, alt. s.m. 200 m, 15.IV.1984. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 08401.

Étymologie: notho-espèce amicalement dédiée à Madame Zisso BORAKIS (Bruxelles).

Description: Plante de port intermédiaire, haute de 28 cm, élancée, munie d'un épi assez dense et court composé de 5 fleurs de taille moyenne. Sépales intermédiaires, verts, aux bords enroulés; le sépale médian rabattu sur le gynostème, les sépales latéraux étalés, légèrement maculés de pourpre. Pétales étalés, intermédiaires. Labelle convexe, tendant à prendre une position horizontale, obscurément quadrilobé, muni de légères gibbosités bordées d'une pilosité blanche, de couleur noire foncée, avec des marges étalées rougeâtres devenant jaunes sur les bords. Macule bleue, en forme de H. Cavité stigmatique intermédiaire, brune, arrondie mais creusée en forme de V dans le fond et munie d'une pilosité blanchâtre. Appendix absent.

Commentaire: *Ophrys x borakisiana* doit à *O. attaviria* son épi court, ses sépales latéraux étalés, son sépale dorsal rabattu sur le gynostème, son labelle quadrilobé tendant vers l'horizontale, le fond de sa cavité stigmatique creusée en V et muni d'une pilosité blanche. Il tient d'*O. mammosa* son port élancé, la largeur de ses sépales, les petites macules pourpres de ses sépales latéraux, son labelle convexe muni d'ébauches de gibbosités, sa macule en forme de H, sa cavité stigmatique brune et arrondie extérieurement. Il est intermédiaire par sa taille, son stade de floraison, la couleur, la forme, la taille et la position plane de ses pétales (rabattus vers l'arrière chez *O. mammosa*, vers l'avant chez *O. attaviria*), la forme et la couleur générales de son labelle ainsi que de sa macule où le H d'*O. mammosa* se brouille et s'arrête au centre du labelle comme la macule d'*O. attaviria*.

Référence: DELFORGE, P. & DELFORGE, C. - *Ophrys x borakisiana* hybr. nat. nov. *L'Orchidophile* 15(63) [1984]: 687.