

Ophrys ×borgersiae

P. DELFORGE

[*Ophrys reinholdii* SPRUNER ex H. FLEISCHMANN × *Ophrys spruneri* NYMAN]

Descriptio holotypi: Planta ei *Ophrydis reinholdii* similis, ad 22cm alta. Flores 2. Sepala colore roseo viridi et purpurei-maculato; dimidia inferiora sepalorum lateralium purpurea violacea. Petala forma intermedia, purpurea viridi-maculata, villosa, leviter recurvata. Labellum fuscum trilobum, marginibus reflexis, lobo mediano convexo trapeziformi, lobis lateralibus valde convexis cum pilis albidis. Macula biscutelliformis separate, parallela et quadrangulata. colore fusco cum angusto limbo caeruleo fulgenti. Cava stigmatica colore intermedio. Appendix brevis.


Holotypus: Graecia, Peloponnesus, provincia Laconia, ad Dafni, 4.IV.1983. Leg. Monique BORGERS. In Herb. Pierre Delforge sub n° 08301.

Étymologie: notho-espèce cordialement dédiée à Madame Monique BORGERS (Bruxelles, Belgique), qui a trouvé et récolté la plante.

Description: Plante ayant le port grêle d'*Ophrys reinholdii*. haute de 22 cm, portant 2 fleurs. Sépales de couleur rose tachée de vert et de pourpre; la moitié inférieure des sépales latéraux est plus foncée, d'un violet pourpre soutenu. Pétales intermédiaires, plus longs que ceux d'*O. reinholdii*, plus courts et plus larges que ceux d'*O. spruneri*, veloutés, pourpres tachés de vert, légèrement rabattus vers l'arrière. Labelle foncé, trilobé, aux bords enroulés; lobe médian convexe, en forme de trapèze; lobes latéraux très convexes, munis d'une pilosité blanche. Macule en forme de 2 gouttes séparées, assez carrées et parallèles, aux centres gris foncé bordés d'une bande bleu brillant. Cavité stigmatique bicolore où le noir et le blanc forment un dessin intermédiaire entre ceux des parents. Appendice petit, également intermédiaire.

Commentaire: S'il a le port, la pilosité blanche des épaulements du labelle et le gynostème d'*Ophrys reinholdii*, *O. ×borgersiae* montre cependant de très nombreux caractères intermédiaires: la couleur des sépales, la forme et la couleur des pétales et du labelle. À elle seule, la macule offre un compromis subtil entre celles des parents: les deux gouttes convergentes grises bordées largement de blanc d'*O. reinholdii* et le H aux montants parallèles bleu brillant finement bordé de bleu pâle d'*O. spruneri* ont formé ici deux gouttes quadrangulaires parallèles aux centres gris bordés de bleu. La complexité de ce mariage de formes et de couleurs se retrouve également au niveau des dessins blancs et noirs de la cavité stigmatique. À Dafni nous avons trouvé deux pieds identiques d'*O. ×borgersiae* en pleine floraison au milieu de nombreux *O. spruneri* fleuris et d'une vingtaine d'*O. reinholdii* qui, plus tardifs, n'avaient qu'une ou deux fleurs ouvertes. Nous l'avons revu en Messénie, le 9 avril a Metamorphosis et le 10 avril près d'Hatzi, toujours au milieu des parents. Chaque fois nous avons pu constater la stabilité morphologique de cet hybride, la macule, seule, affectant des formes plus variables, se rapprochant parfois du H d'*O. spruneri*.

Référence: DELFORGE, P. 1983.- Trois hybrides nouveaux d'*Ophrys spruneri* NYMAN. *L'Orchidophile* 14(59): 496.



HERBARIUM Pierre DELFORGE

Orchidaceae

Ophrys ×borgersiae

P. DELFORGE 1983

[*Ophrys reinholdii* SPRUNER ex H. FLEISCHMANN × *O. spruneri* NYMAN]

Date: 4.IV.1983

N° 08301

Pays: Grèce

Région: Péloponnèse

Province: Laconie

Localité: Dafni

Habitat: zone herbeuse pâturée avec *Asphodelus aestivus* ainsi qu'*Himantoglossum robertianum*, *Neotinea lactea*, *Ophrys attica*, *O. reinholdii*, *O. spruneri*, *O. villosa*, *Orchis italica*, *Vermeulenia papilionacea* var. *aegaea*.

Publication: DELFORGE, P. 1983.- Trois hybrides nouveaux d'*Ophrys spruneri* NYMAN. *L'Orchidophile* 14(59): 496.

leg. Monique BORGERS; det. Pierre DELFORGE 1983

H O L O T Y P E