HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys ×dessartiana P. DELFORGE 1997
(*Ophrys astypalaeica* P. DELFORGE × *O. parosica* P. DELFORGE)

Date: 4.IV.1997 N° 09705

Pays: Grèce **Région**: Dodécanèse

Province: Astypaléa **Localité**: Ag. Pentelimon

Altitude: 130 m UTM_{WGS84}: 35SMA3942

Habitat: sur pente calcaire éocène tendre avec éboulis, phrygana moussue à *Calicotome villosa, Cistus incanus, Euphorbia acanthothamnos, Prasium majus, Salvia triloba, Sarcopoterium spinosum, Teucrium brevifolium, Thymus capitatus* avec *Helichrysum italicum, Psoralea bituminosa, Ranunculus asiaticus, Tordylium apulum* et *Anacamptis pyramidalis, Ophrys astypalaeica, O. leochroma, O.* cf. *leucadica, O. ferrum-equinum, O. omegaifera, O. parosica, O. sicula.*

Publication: DELFORGE, P. 1997.- Nouveaux hybrides naturels d'orchidées d'Europe. *Natural. belges* **78** (Orchid. 10): 180.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1997

HOLOTYPE

Fig. 4. *Ophrys ×dessartiana* (*O. astypalaeica* × *O. parosica*). Grèce, Dodécanèse, Astypaléa, 4.IV.1997.

Ophrys ×dessartiana

P. DELFORGE

(*Ophrys astypalaeica* P. DELFORGE × *O. parosica* P. DELFORGE)

Descriptio holotypi: Sepala petalaque ut in subgrege Ophrydis fuscae. Labellum quadrilobatum, satis magnum, pilosum, fuliginosum, anguste luteo marginatum, sellaeforme, valde mammosum ad basin. Macula plombea, irregulariter atroviolaceo maculata.

Holotypus: Graecia, Dodecanissa, insula Astypalaea, apud Aghios Pentelimon, alt. s.m. 130 m, 4.IV.1997. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09705.

Étymologie: notho-espèce amicalement dédiée à Paul Dessart (1931-2001), Chef honoraire de la Section Insectes et Arachnomorphes de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, ancien Vice-Président des Naturalistes belges et co-rédacteur de notre bulletin.

Commentaire: Bien que les parents de l'hybride appartiennent à des groupes d'*Ophrys* voisins où les distinctions entre taxons sont difficiles, l'hybride se remarque immédiatement par la structure très particulière de son labelle où la combinaison du genouillement basal d'*O. parosica* avec les crêtes basales en plateau d'*O. astypalaeica* a produit deux fortes mammosités basales prolongées par le redressement de la moitié distale, donnant au labelle une forme de selle que l'on trouve seulement chez *O. atlantica*. La coloration du labelle est proche de celle d'*O. astypalaeica*, mais la macule, gris plombé et irrégulièrement tachetée, rappelle celle d'*O. parosica*.

Référence: DELFORGE, P. 1997.- Nouveaux hybrides naturels d'Orchidées d'Europe. *Natural. belges* **78** (Orchid. 10): 180.