



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys xgeerinckiana P. DELFORGE 2006

(*Ophrys bombyliflora* LINK × *O. rhodia* (H. BAUMANN & KÜNKELE) P. DELFORGE)

Date: 7.IV.2006 N° 10610

Pays: Grèce Province: Dodécannèse

Localité: île de Rhodes, Laerma

Altitude: 230 m UTM_{WGS84}: 33SNA8400

Habitat: Phrygana herbeuse avec *Sarcopoterium spinosum*, *Lavandula stoechas*, *Pistacia lentiscus* et quelques *Pinus halepensis* ainsi qu'*Ophrys attaviria*, *O. bombyliflora*, *O. cinereophila*, *O. «flavipes-fusca»*, *O. omegaiifera*, *O. persephona*, *O. phryganae*, *O. polyxo*, *O. regis-ferdinandii*, *O. speculum*, *Orchis fragrans*, *O. italica*, *O. papilionacea* var. *heroica*, *O. sancta*, *Serapias bergonii*.

Publication: DELFORGE, P. - Nouveaux hybrides d'*Ophrys* de l'île de Rhodes (Dodécannèse, Grèce). *Natural. belges* 87 (Orchid. 19): 217-227 (description: 220).

leg. & det. Pierre DELFORGE 2006

H O L O T Y P E

Ophrys xgeerinckiana

P. DELFORGE

[*Ophrys bombyliflora* LINK × *O. rhodia* (H. BAUMANN & KÜNKELE) P. DELFORGE]

Descriptio holotypi: Herba procera. Flores parvi, mensuris inter eos parentium mediis. Sepala elongata-rotundata, viridia. Petala triangulata, leviter auriculata, viridia. Labellum valde trilobatum, cum gibberis acutis pilosisque et macula centrali, extensa, complexa, candido marginata. Appendix brevis, chlorina. Gynostemium leviter acuminatum. Cavae stigmaticae structura inter eas parentium media. Area basilaris labelli rubro tinctoria.

Holotypus: Graecia, insula Rhodus, prope Laerma (UTM: 35SNA0084), alt. s.m. 230 m, 7.IV.2006. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10610.

Étymologie: notho-espèce amicalement dédiée au botaniste Daniel GEERINCK (1945-2016; Bruxelles), qui fut membre du Conseil d'administration des Naturalistes belges et, notamment, grand spécialiste des orchidées d'Afrique Centrale.

Commentaire: Une vingtaine d'individus en tout d'*Ophrys xgeerinckiana* ont été notés sur quatre sites de l'île de Rhodes, un site en 1984, les trois autres en 2006. Cet hybride semble en effet fréquent et il a été parfois signalé et même figuré, mais jamais décrit. *O. xgeerinckiana* possède, une morphologie florale qui rappelle fort celle d'*O. bombyliflora*, d'autant plus que ses deux parents possèdent des sépales verts et des fleurs relativement petites; il faut d'ailleurs examiner très attentivement les populations d'*O. bombyliflora* pour le repérer. Il se distingue d'*O. bombyliflora* notamment par le port plus élancé, la taille un petit peu plus grande des fleurs, les sépales plus allongés, les pétales auriculés souvent plus verts, le lobe médian du labelle un peu plus allongé, muni d'une macule beaucoup plus développée, plus colorée, souvent éclatante et lisérée de blanchâtre, délimitant un champ basal plus clair, parfois un peu rougeâtre, l'appendice dirigé vers l'avant et souvent tridenté, le gynostème un peu acuminé et la cavité stigmatique souvent encore munie, de part et d'autre, d'ébauches de crêtes, comme *O. bombyliflora*, mais aussi de pseudo-yeux arrondis et noirâtres, comme *O. rhodia*.

Référence: DELFORGE, P. 2006.- Nouveaux hybrides d'*Ophrys* de l'île de Rhodes. *Natural. belges* 87 (Orchid. 19): 220.