



HERBARIUM Pierre DELFORGE
O r c h i d a c e a e

Ophrys xgrinincensis

P. DELFORGE 1989

[*Ophrys provincialis* (H. BAUMANN & KÜNKELE) H.F. PAULUS × *O. saratoi* E.G. CAMUS (pro hybr.)]

Date: 14.V.1988

N° 08824

Pays: France

Région: Provence-Alpes-Côte d'Azur

Province: Alpes-Maritimes **Localité:** Saint-Vallier-de-Thiey

Altitude: 700 m

UTM_{WGS84}: 32TLP2541

Habitat: pelouse calcicole par places suintante et lisière de chênaie à *Quercus pubescens* avec *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera damasonium*, *Cephalanthera longifolia*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum hircinum*, *Limodorum abortivum*, *Neotinea tridentata*, *Ophrys apifera*, *O. provincialis*, *O. saratoi*, *O. scolopax*, *Orchis purpurea*, *Serapias vomeracea*, *Vermeulenia papilionacea*.

Publication: DELFORGE, P. 1989.- À propos de sept hybrides d'*Ophrys*. *Natural. belges* **70** (Orchid. 3): 92.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1988

H O L O T Y P E

Ophrys xgrinincensis

P. DELFORGE

[*Ophrys provincialis* (H. BAUMANN & KÜNKELE) H.F. PAULUS × *O. saratoi* E.G. CAMUS.]

Descriptio holotypi: Herba media sed robusta, ad 20 cm alta. Flores satis magni, 4. Sepala patula, rosea valde viridi suffusa. Petala longa, lata et triangulata, marginibus undulatis, violacea viridi brunneique suffusa. Labellum integrum, planum sed paulum convexum, totum nigrum, intense velutinum Ophrydis saratoi effectum. Macula cinerea fulgenta, forma intermedia, magna, ± H-formis, lata, in tota parte media labelli sita. cum ramusculos ad labelli basin. Appendix parva triangulata. Cava stigmatica gynostemiumque ut in Ophryde provinciali.

Holotypus: Gallia, Alpes-Maritimes, ad Saint-Vallier-de-Thiey, 14.V.1988. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 08824.

Étymologie: *Grinincensis*, -is, -e: qui appartient à la région de Grasse (Alpes-Maritimes, France).

Description: Plante de taille moyenne mais robuste, haute de 20 cm. Fleurs assez grandes au nombre de 4. Sépales étalés, rose fortement teinté de vert. Pétales longs, larges, triangulaires, aux marges ondulées, violacé teinté de vert et de brun. Labelle entier, plan mais un peu convexe, entièrement noir, densément recouvert de poils comme celui d'*O. saratoi*. Macule gris brillant, de forme intermédiaire entre celles des parents, grande, en forme de H, large, envahissant toute la partie centrale du labelle, avec des ramifications remontant jusqu'à sa base. Appendice triangulaire petit. Cavité stigmatique et gynostème semblables à ceux d'*O. provincialis*.

Commentaire: *Ophrys xgrinincensis* tient d'*O. provincialis* notamment la composante verte de la teinte du périanthe externe, la grande taille et la forme triangulaire des pétales ainsi que la forte ondulation de leurs bords, le labelle large et entier, la large macule en forme de H, la forme de la cavité stigmatique et du gynostème. Il doit essentiellement à *O. saratoi* la composante rose de la couleur du périanthe externe, la forme générale, la pilosité noirâtre et le port du labelle, l'envahissement de la partie apicale du labelle par la macule et l'ocelle central de celle-ci. La couleur verte et rose brunâtre des sépales et brun sale foncé des pétales est particulièrement caractéristique de l'hybride. *O. saratoi* a presque toujours un périanthe externe rose, rarement blanc; les individus ayant un périanthe externe coloré en vert plus ou moins rosi ou bruni sont très probablement en fait des *O. xgrinincensis*.

Référence: DELFORGE, P. 1989.- À propos de sept hybrides d'*Ophrys*. *Natural. belges* **70** (Orchid. 3): 92, 94.

saratoi × *O. provincialis*