Fig. 7. *Ophrys ×quintartiana* (*O. ariadnae* × *O. ferrum-equinum*). Grèce, Cyclades, Amorgos, 21.IV.1997.



HERBARIUM Pierre DELFORGE

Orchidaceae

Ophrys ×quintartiana P. DELFORGE 1997
(*Ophrys ariadnae* PAULUS × *O. ferrum-equinum* DESFONTAINES)

Date: 21.IV.1997 N° 09710

Pays: Grèce **Région**: Cyclades

Province: Amorgos **Localité**: Terlaki

Altitude: 220 m UTM_{WGS84}: 35SMA0179

Habitat: sur calcschistes, anciennes terrasses de cultures très herbeuses avec *Adonis microcarpa, Asphodelus microcarpus, Briza maxima, Ferula communis, Micromeria nervosa, Muscari comosum, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Sarcopoterium spinosum* et de nombreuses fabacées diverses ainsi qu'*Ophrys ariadnae, O. bombyliflora, O. ferrum-equinum, O. lutea, O. phryganae, O. sicula, Orchis papilionacea, O. sancta.*

Publication: DELFORGE, P. 1997.- Nouveaux hybrides naturels d'orchidées d'Europe. *Natural. belges* **78** (Orchid. 10): 183.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1997

HOLOTYPE

Ophrys ×quintartiana

P. DELFORGE

(*Ophrys ariadnae* H.F. PAULUS × *O. ferrum-equinum* DESFONTAINES)

Descriptio holotypi: Sepala vinoso-livida, atrovinoso dense maculata. Petala elongata, atrovinosa viridi suffusa, marginibus ondulatis ciliatisque. Labellum valde trilobatum, convexum rotundumque, molle, fuscum, piceum. Macula simplex, duabus lineis formata, cyanea fulgida cretaceo marginata. Cava stigmatica nivea, nigro quadripunctata. Tempus floritionis inter ea parentium medium.

Holotypus: Graecia, Cyclades, insula Amorgos, apud Terlaki, alt. s.m. 220 m, 21.IV. 1997. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09711.

Étymologie: notho-espèce cordialement dédiée à Alain QUINTART (La Hulpe, Belgique), Chef honoraire du Département Éducation et Nature de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Président des Naturalistes belges, qui a toujours soutenu avec enthousiasme la publication des numéros spéciaux Orchidées dans le bulletin de son association.

Commentaire: Deux exemplaires d'*Ophrys ×quintartiana* ont été repérés en pleine floraison parmi des centaines d'*O. ferrum-equinum* pour la plupart en début de floraison. Par leur labelle très trilobé, leur cavité stigmatique blanche tachée de noir, leur macule réduite à deux traits longitudinaux et la couleur sordide de leurs pétales, ils faisaient immédiatement penser à des hybrides avec un taxon du groupe d'*O. reinholdii* qui n'avait pas encore été observé dans l'île d'Amorgos. Après un quadrillage systématique du site, deux pieds d'*O. ariadnae* presque entièrement défleuris furent découverts dans un buisson de *Sarcopoterium spinosum*. Chez *O. ×quintartiana*, la forme du labelle et l'ornementation de la cavité stigmatique sont fortement réminiscentes d'*O. ariadnae* tandis que le dessin et la couleur de la macule rappellent *O. ferrum-equinum*; les dimensions du labelle et le temps de floraison sont intermédiaires entre ceux des parents.

Référence: DELFORGE, P. 1997.- Nouveaux hybrides naturels d'Orchidées d'Europe. *Natural. belges* **78** (Orchid. 10): 183.