



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys xraynaudii

P. DELFORGE 1994

[*Ophrys argolica* H. FLEISCHMANN × *Ophrys reinholdii* SPRUNER ex H. FLEISCHMANN]

Date: 18.IV.1991 **N°** 09117

Pays: Grèce **Région:** Péloponnèse

Province: Laconie **Localité:** Assimi

Altitude: 180 m **UTM**_{WGS84}

Habitat: olivaiie herbeuse et garrigue à *Lavandula stoechas* avec *Anteriorchis fragrans*, *Herorchis boryi*, *Ophrys argolica*, *O. attica*, *O. cerastes*, *O. reinholdii*, *O. spruneri*, *O. taygetica*, *Serapias bergonii*, *S. lingua*, *S. vomeracea*, *Vermeuleniana papilionacea* var. *aegaea*.

Publication: DELFORGE, P. 1994.- Faut-il nommer les hybrides d'Orchidées ? Un hommage à Christian Raynaud. *L'Orchidophile* 25(111): 68.

leg. Zisso BORAKIS; det. Pierre DELFORGE 1991

H O L O T Y P E

Ophrys xraynaudii

P. DELFORGE

[*Ophrys argolica* H. FLEISCHMANN × *Ophrys reinholdii* SPRUNER ex H. FLEISCHMANN]

Descriptio holotypi: Herba procera, ad 23 cm alta. Flores medii, 3. Sepala lata, circinata, rosea, lateralia leviter pallide violaceo suffusa. Petala pilosa, forma laxè triangulata-circinata, colore roseo viridi suffoso, marginibus leviter undulatis. Labellum subrhomboidale, trilobatum, fuscum molleque in centrum, lobis lateralibus superiorae partis marginibusque cum pilis albidis longis. Macula centralis, media, cinerea albedo cincta. Appendix triangula, viridis. Cava stigmatica candida cum maculis nigris. Pseudo-oculi adsunt.

Holotypus: Graecia, Peloponnesus, Laconia, apud Assimi, alt. s.m. 180m, 18.IV.1991. Leg. Z. BORAKIS. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09117.

Étymologie: notho-espèce dédiée à Christian RAYNAUD (1939-1993), qui fut Président du groupement S.F.O. Languedoc-Roussillon et Professeur à l'Institut de Botanique (Montpellier).

Description: Plante élancée, haute de 23 cm, portant 3 fleurs moyennes. Sépales arrondis, roses, les latéraux légèrement teintés de violet pâle. Pétales largement triangulaires-arrondis, veloutés, rose lavé de vert, les bords légèrement ondulés. Labelle subrhomboidal, trilobé, noirâtre et velouté au centre, les bords de la moitié sommitale et les lobes latéraux munis d'une longue pilosité blanchâtre. Macule centrale, intermédiaire, gris bordé de blanc. Appendix triangulaire, verdâtre. Cavité stigmatique blanche avec des taches noires. Pseudo-yeux présents.

Commentaire: Bien que provenant du croisement de deux espèces appartenant à deux groupe d'*Ophrys* assez éloignés, *O. xraynaudii* n'est déterminable sur le terrain qu'après un examen attentif qui, seul, permet de mettre en évidence ses caractères intermédiaires. Il garde d'*O. argolica* la largeur et l'arrondi des sépales et des pétales, la forte pilosité blanche des épaulements du labelle, la macule centrale en forme de bésicles, l'appendice simplement triangulaire et les pseudo-yeux bordant la cavité stigmatique; il doit entre autres à *O. reinholdii* la teinte verte des pétales, la découpeure et la couleur du labelle, l'étalement rhomboïdal de son lobe médian, l'importance et la coloration de la macule, ainsi que la forme et les taches blanches et noires de la cavité stigmatique.

Référence: DELFORGE, P. 1994.- Faut-il nommer les hybrides d'Orchidées ? Un hommage à Christian Raynaud. *L'Orchidophile* 25(111): 68.

