



Ophrys* ×*vanderspekiae

P. DELFORGE

[*Ophrys cilentana* P. DEVILLERS & J. DEVILLERS-TERSCHUREN × *O. neglecta* PARLATORE]

Descriptio holotypi: Herba 15 cm alta. Flores 4. Bracteae roseo-viridia. Sepala rosea, viridi suffusa, ovata-elongata. Petala olivaceo-cerina, dense villosa, ovata. Labellum integrum, convexum, subtrapéziforme, badium, molle, flavo-virente marginata in distale parte; pilositas submarginalis densa, dilute bubalina, in zona interna dilute purpurescens, in zona margine proxima primulina. Macula basalis, scutiformis, irregularis, lazulina, atroviolaceo minute punctata, late eburneo cincta, aream basilarem delineans ad cavitatem stigmaticam affixaque. Appendix triangulata, chlorina, erecta. Cavitas stigmatica labelli area basalisque fuscae, cum projectura; pseudo-oculi duabus cristis divergentis atrisque formati. Gynostemium breve. Tempus floritionis inter ea parentium medium.

Holotypus: Italia, Campania, provincia Salernum, Cilento, circa Forla (UTM: 33TWE3038), alt. s.m. 90 m, 5.IV.2001. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10102.

Étymologie: notho-espèce dédiée, en témoignage de gratitude et d'estime, au Dr Veronica VAN DER SPEK (1950-2013; Bruxelles), qui affectionnait les plantes, les orchidées en particulier.

Description: Plante haute de 15 cm. 4 fleurs. Bractées vert rosâtre. Sépales roses, lavés de vert, ovales-allongés. Pétales vert ocré, densement velus, ovales. Labelle entier, convexe, subtrapéziforme, brun pourpré, velouté, muni d'une marge jaune verdâtre dans la moitié distale; pilosité submarginale dense, chamais clair, un peu pourprée dans la couronne interne, jaunissante dans la couronne externe. Macule basale, scutiforme, irrégulière, bleue, finement ponctuée de violet foncé, largement bordée de blanchâtre, délimitant un champ basal et atteignant les parois de la cavité stigmatique. Appendice triangulaire, jaune verdâtre, dressé. Champ basal et cavité stigmatique brun foncé, celle-ci munie d'une saillie délimitant le champ basal; pseudo-yeux formés de deux crêtes divergentes, noirâtres. Gynostème bref. Temps de floraison intermédiaire entre ceux des parents.

Commentaire: Les trois pieds d'*Ophrys* ×*vanderspekiae*, deux en fleurs, le troisième en fin de floraison, ont été trouvés, parmi des centaines d'*O. cilentana* en fin de floraison ou complètement défloris, majoritairement à sépales et pétales verdâtres, et des centaines d'*O. neglecta* en boutons ou tout en début de floraison, à sépales et pétales roses. Seules plantes en pleine floraison au milieu d'une espèce en boutons et d'une autre largement déflurie, les trois pieds d'*O. vanderspekiae* se signalaient immédiatement par les couleurs très vives et intermédiaires des grands pétales et par la macule irrégulière du labelle.

D'*Ophrys neglecta*, *O. vanderspekiae* a gardé notamment la coloration rosâtre des bractées (verdâtre chez *O. cilentana*), l'arrondi encore marqué des sépales (plus lancéolés chez *O. cilentana*) dont la teinte de fond reste rose (verdâtres chez *O. cilentana* sur ce site), la position, le velouté et la forme ovale des pétales (dressés, glabres ou simplement ciliés et triangulaires-allongés chez *O. cilentana*), la forme subquadrangulaire du labelle (plus arrondi chez *O. cilentana*), la pilosité labellaire submarginale large, claire, régulière (moins large, plus pourpre, parfois atténuée dans les quarts latéro-distaux chez *O. cilentana*), la macule basale encore scutiforme (atteignant le centre du labelle et en forme de X ou de H chez *O. cilentana*), l'appendice assez important et dressé (plus petit et pendant chez *O. cilentana*), la cavité stigmatique sans plage maculaire (munie d'une plage maculaire souvent contrastante chez *O. cilentana*), les pseudo-yeux en forme de crêtes divergentes, entièrement noirâtres (arrondis et cerclés de pâle chez *O. cilentana*) et, enfin, le sommet du gynostème obtus (acuminé chez *O. cilentana*).

Quant à l'influence d'*Ophrys cilentana* chez *O. vanderspekiae*, elle se marque notamment par la suffusion verte dans la couleur rose des sépales (rose pur chez *O. neglecta*), la coloration verte ou vert ocré, assez éclatante et contrastante, des pétales (rose concolore avec les sépales chez *O. neglecta*), la coloration brune et assez étendue du labelle (largement bordé de jaune chez *O. neglecta*), la teinte pourprée de la couronne interne de la pilosité submarginale (jaune à chamais chez *O. neglecta*), l'absence d'une touffe de poils longs au-dessus de l'appendice (présence de ce caractère chez *O. neglecta*), l'étendue, le morcellement et la ponctuation de la macule (basale, simplement scutiforme et sans marbrure chez *O. neglecta*).

Référence: DELFORGE, P. 2001.- *Ophrys* ×*vanderspekiae* hybr. nat. nov. *Natural. belges* 82 (Orchid. 14): 133-134.

HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys ×*vanderspekiae*

P. DELFORGE 2001

[*Ophrys cilentana* J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS × *Ophrys neglecta* PARLATORE]

Date: 5.IV.2001 **N°** 10102
Pays: Italie **Région:** Campanie
Province: Salerne **Localité:** 2 km NE de Forla
Altitude: 90 m **UTM**_{WGS84}: 33TWE3038

Habitat: pâture avec quelques buissons de *Pistacia lentiscus*, *Pyrus amygdaliformis*, *Spartium junceum* ainsi qu'*Ophrys cilentana*, *O. neglecta*, *Serapias lingua*, *Vermeulenian papilionacea* var. *papilionacea*.

Publication: DELFORGE, P. 2001.- *Ophrys* ×*vanderspekiae* hybr. nat. nov. *Natural. belges* 82 (Orchid. 14): 130-136.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2002

H O L O T Y P E